



# 予防接種スケジュール



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期/思春期								
		生後直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	
ヒブワクチン インフルエンザ菌b型	不活化			①	②	③						④												
肺炎球菌	不活化			①	②	③						④												
B型肝炎	不活化			①	②				③															
ロタウイルス	1価			①	②				(注) 計2回、②は、生後24週までに完了すること															
	5価			①	②	③			(注) 計3回、③は、生後32週までに完了すること															
4種混合	不活化			①	②		③				④※1													
3種混合	不活化			①	②		③				④※1													
	不活化																⑤※2					⑥11-12歳※3		
2種混合	不活化																					11歳①	12歳	
ポリオ	不活化			①	②		③				④※1													
	不活化																⑤※4							
BCG	生						①																	
麻疹風疹 (MR)	生										①											②※5		
水痘	生										①		②											
おたふくかぜ	生										①											②※6		
日本脳炎	不活化															①②	③					(7.5歳まで)	④9-12歳	
インフルエンザ	不活化																						毎年(10月、11月などに) ①②	13歳より①

定期接種の推奨期間
  任意接種の推奨期間
  定期接種の接種可能な期間
  任意接種の接種可能な期間
  クリニックとして推奨する期間

- (※1) ③-④は6か月以上あけ、標準的には③終了後12-18か月の間に接種する
- (※2) 就学前児の百日咳抗体価が低下していることを受けて、就学前の追加接種を推奨
- (※3) 百日咳の予防を目的に、2種混合の代わりに3種混合ワクチンを接種してもよい
- (※4) ポリオに対する抗体価が減衰する前に就学前の接種を推奨
- (※5) 5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間(年長さんの学年)での接種を推奨
- (※6) 予防効果を確実にするために、2回接種が必要である①は1歳を過ぎたら早期に接種、②はMRと同時期、5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間(年長さんの学年)での接種を推奨

メモ